

Comunicado a los Padres y Apoderados.

Vacunación 1º básico

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludar, comunicamos a ustedes que durante los meses de julio a noviembre se realizará la vacunación escolar correspondiente al año 2020. Para esto, se citarán a los alumnos vía telefónica en horarios definidos para evitar aglomeraciones y riesgo de exposición.

En el complejo escenario de la Emergencia sanitaria por COVID-19 y frente a la necesidad de mantener la protección frente a enfermedades prevenibles por vacuna y así evitar brotes a causa de ellas, la continuidad de las diferentes estrategias de vacunación es fundamental.

Al igual que años anteriores estas vacunas serán administradas por personal debidamente capacitado, que tiene las competencias técnicas para realizar esta actividad, lo cual nos asegura que el proceso se llevará a cabo cumpliendo con estándares de seguridad para los niños (as) para esto se les informa y solicita a los padres lo siguiente:

- La vacunación será realizada en áreas bien ventiladas, desinfectadas frecuentemente y en horarios diferidos para evitar aglomeraciones.
- Se mantendrá el distanciamiento social dentro del establecimiento.
- Se dispondrá de desinfectante y control de temperatura a la entrada del establecimiento.
- Se solicita que el escolar sea acompañado solo por un acompañante.
- Tanto el escolar como su acompañante deben utilizar mascarilla en todo momento.

Las vacunas correspondientes a 1º básico son:

- **VACUNA TRESVÍRICA:** que lo protegerá contra el Sarampión, Parotiditis (Paperas) y la Rubéola.
 - CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: Déficit inmunitario, historia de anafilaxia con dosis previa, fiebre sobre 38.5°C y embarazadas.
 - REACCIONES POST VACUNA: A partir del 5º día puede observarse reacciones leves como fiebre, síntomas rinofaríngeos leves o exantema discreto.
- **VACUNA TRIPLE DTPa:** que lo protegerá contra difteria, tétanos y tos convulsiva.
 - CONTRAINDICACIONES: Fiebre sobre 38.5°C, alergia u otras complicaciones comprobadas a algún componente de la vacuna en administraciones anteriores. Inmunodepresión
 - REACCIONES POST VACUNA: Principalmente dolor, enrojecimiento e inflamación en el sitio de punción por 1 a 2 días. En algunos casos se puede presentar fiebre durante 24 a 48 hrs.

Esta intervención, requiere de su colaboración, por lo cual solicitamos que su hijo/a asista al establecimiento el día señalado, en caso que su hijo presente alguna contraindicación deberá informar por escrito a su Profesor/a Jefe.

OBSERVACIONES: Registrar si su hijo presenta contraindicaciones.